

Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|--|
| Extermination Terrebonne Inc. | 450-477-3932 | 1-800-361-9474 | www.exterminationterrebonne.com |
| Extermination Joliette Inc. | 450-759-5901 | 1-800-361-9474 | www.exterminationjoliette.com |
| Extermination St-Hubert Inc. | 450-676-2358 | 1-800-361-9474 | www.exterminationsthubert.com |

CHAUVE-SOURIS

APPARENCE

Il existe au Québec huit espèces de chauves-souris insectivores difficiles à différencier les unes des autres. La chauve-souris est le seul mammifère vraiment capable de voler. L'envergure des ailes, selon l'espèce, varie majoritairement entre 20 et 35 cm. La taille de leur corps est approximativement celle d'une souris sauf pour la chauve-souris rousse, beaucoup plus imposante qui, au Québec, est une espèce menacée.



ALIMENTATION

La chauve-souris se nourrit exclusivement de moustiques qu'elle capture en vol et elle peut facilement en capturer de 500 à 1000 en une seule heure, elle est donc très bénéfique.

MŒURS

Durant l'été, plusieurs espèces de chauves-souris choisissent des habitations pour s'y reposer en colonies. (corniche, crevasses, fissures autour du toit, grenier etc.) Elles peuvent pénétrer dans des espaces avec une ouverture aussi petite que 6mm de diamètre. Les femelles reviennent majoritairement toujours au même endroit année après année et y élève ses jeunes. Elle est très grégaire et ses colonies peuvent comprendre quelques centaines à quelques milliers d'individus. Elle partage souvent son espace avec la grande chauve-souris brune. La colonie s'établit de préférence près d'un plan d'eau, endroit où les moustiques abondent. Vers le mois d'octobre et pendant tout l'hiver, la colonie hiberne dans des cavernes ou des mines abandonnées ou dans des cavernes naturelles. Parfois, si les conditions hivernales sont favorables, comme une humidité élevée et des températures au-dessus du point de congélation, les chauves-souris se risqueront à hiverner dans des bâtiments.

REPRODUCTION

L'accouplement a lieu en automne ou en hiver et le sevrage des petits a généralement lieu en juillet ou en août. Selon l'espèce, elles peuvent vivre jusqu'à 30 ans.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Les chauves-souris sont inoffensives et détruisent de grandes quantités d'insectes nuisibles. Elles ne causent aucun dommage aux structures des bâtisses où elles s'abritent. Toutefois, bien qu'elles soient utiles, lorsqu'elles envahissent les bâtiments, les chauves-souris peuvent devenir une menace car les parasites qu'elles transportent sont tous préoccupants. La maladie la plus commune est la rage, maladie virale qui peut être fatale.