

Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

Extermination Terrebonne Inc.	450-477-3932	1-800-361-9474	www.exterminationterrebonne.com
Extermination Joliette Inc.	450-759-5901	1-800-361-9474	www.exterminationjoliette.com
Extermination St-Hubert Inc.	450-676-2358	1-800-361-9474	www.exterminationsthubert.com

TRIBOLIUM DE LA FARINE

Tribolium confusum

APPARENCE

Le tribolium brun de la farine est un petit coléoptère brun rougeâtre de 3,5mm de long. Son corps est lisse et allongé. La larve vermiforme peut atteindre 6mm de longueur à son plein développement. Elle se distingue par les deux courtes pointes qui terminent son abdomen.



ALIMENTATION

Les adultes et les larves se nourrissent de farine de céréales; ils sont incapables de perforer les grains non moulus. Ils se nourrissent également de produits de mouture, de pois, haricots, noix, épices, chocolat, spécimens de musées comme les plantes et les insectes. Sa petite taille et ses pièces buccales de broyeur lui permettent de s'infiltrer dans les contenants et les emballages fermés.

MŒURS

On les retrouve dans les minoteries, les usines alimentaires, les boulangeries, les habitations et parfois dans des musées.

REPRODUCTION

Les femelles pondent 300 à 400 œufs dans les aliments qu'elles infestent, au rythme de 2 à 3 œufs par jour. La durée du cycle complet varie généralement entre 7 semaines et 3 mois. Un tribolium femelle peut vivre jusqu'à 2 ans et un mâle jusqu'à 3 ans.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Le tribolium brun de la farine est un insecte qui se déplace rapidement lorsqu'il est dérangé, mais il ne vole pas. Ils laissent une odeur désagréable dans les aliments, les rendant impropres à la consommation.